



Mourad SEBBAR



Maroc

Samedi 26 janvier
14h00 – 14h20



SALLE : FORUM 2/3

- Docteur en médecine dentaire
- Diplôme national de spécialité en orthopédie dento-faciale
- Diplôme universitaire en radiologie maxillo-faciale
- Master Damon. Madrid. Espagne.
- Master INVISALIGN. Malaga. Espagne.
- Auteur de plusieurs publications nationales et internationales et chapitres de livres.

THÉRAPEUTIQUES RAISONNÉES DES MALOCCLUSIONS DE CLASSE II

Les dysmorphoses de classe II, d'expression clinique variée, associent fréquemment deux composantes : squelettique et dento-alvéolaire. Même si ces anomalies présentent un tableau clinique bien connu permettant une identification presque immédiate, elles concernent, en effet, un ensemble de dysmorphoses très différentes quant à leur variété anatomique et à leur étiopathogénie.

Le traitement sera adapté en fonction de l'âge et la sévérité de la malocclusion. Chez l'enfant, ce traitement repose sur le déverrouillage et la stimulation de la croissance mandibulaire. A l'âge adulte, le traitement sera orthodontique ou ortho-chirurgical en fonction du décalage squelettique et la présence de compensations alvéolaires.

Nous allons présenter, à travers une analyse critique de plusieurs cas cliniques, les différentes attitudes thérapeutiques face à des cas de classes II en fonction de l'âge.